

HK-2 人肾皮质近曲小管上皮细胞

产品信息

产品品牌 : 纪宁生物

中文名称 : 人肾皮质近曲小管上皮细胞

细胞简称 : H K-2

细胞别称 : H k-2;H K2;HumanKid n ey-2

细胞形态 : 上皮细胞样

生长特性 : 贴壁细胞

培养环境 : 空气, 95% ; CO₂, 5% 37℃

冻存条件 : 55% 基础培养基+40% FBS+5% D M S O 液氮

完全培养基 : M E M (含 N E A A) (P M 150410) + 10% F B S(164210-50) + 1%
P /S(P B 180120)

传代步骤

- 1、吸出原培养液。
- 2、加入 2ml 左右 PBS, 轻轻晃动培养瓶润洗细胞,吸出 PBS 丢弃。
- 3、加入 1ml 左右 0.25% 胰蛋白酶溶液 (含 E D T A) , 轻轻晃动培养瓶使之浸润所有细胞。
- 4、放入培养箱消化, 显微镜下看到细胞块中间的细胞明显变圆有间隙时可终止, 全程不要拍打培养瓶。

5、加入 3ml 含血清的培养基终止消化, 吹打细胞使之脱壁并在液体里反复吹打使细胞尽量呈单颗细胞的悬浮液。

6、收集细胞悬液离心, 1200rpm /min 3 分钟, 离心完吸出上清丢弃。

7、加入新鲜培养基, 吹打几下混匀细胞即可, 按比例接种到新培养瓶, 补足培养基, 拧松瓶盖或使用透气瓶盖进行培养。

消化时间 : 2~ 3 分钟

传代比例 (密度) : 1:2-1:4

换液频次 : 2~ 3 次/周

细胞背景描述

H K -2 细胞属源于正常肾的近曲小管细胞, 通过导入 H PV -16 E6/E7 基因而获得永生。将含有 H PV -16 E6/E7 基因的重组的逆转录病毒载体 pLX SN 16 E6/E7 转染外生包装细胞 Psi-2; P si-2 细胞产生的病毒再去感染兼嗜性包装细胞系 PA 317, 最后将 PA 317 细胞产生的病毒颗粒导入正常的肾皮质近曲小管细胞。尽管 pLXSN 16 E6/E7 中含有新霉素抗性, 但未用 G 418 筛选转导克隆。Southern 和 FISH 分析显示, H K -2 细胞来源于单克隆。PC R 检测证实, H K -2 细胞基因组中含有 E 6/E 7 基因。

供体年龄 : 成年

组织来源 : 肾, 皮质/近端小管

细胞类型 : 转化细胞系

生物安全等级 : 2

受体表达 : epiderm algrow th factor(EG F),exp ressed

基因表达 : alkaline phosphatase;gamma glutamyltransferase;leucine aminopeptidase;acid phosphatase;cytokeratin;alpha 3,beta 1 integrin;fibronectin

细胞保藏中心 : ATCC ; CRL-2190 BCRC ; 60097

收到常温细胞后如何处理

细胞培养详细操作步骤请参照纪宁生物细胞培养操作指南

1. 收到常温细胞后, 及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
2. 用 75%酒精擦拭细胞培养瓶表面, 显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖, 将细胞置于细胞培养箱内静置培养 2-4 小时, 以便稳定细胞状态。
3. 仔细阅读细胞说明书, 了解细胞相关信息, 如贴壁特性 (贴壁/悬浮)、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
4. 静置完成后, 取出细胞培养瓶, 镜检、拍照, 记录细胞状态 (所拍照片 将作为后续服务依据); 建议细胞传代培养后, 定期拍照、记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或者对细胞有疑问, 请及时跟我们联系; 对于细胞培养操作及培养。可跟我们的技术支持交流。

用途范围

上海纪宁生物细胞仅供科研实验使用