

肌酐(Cr)含量试剂盒(肌氨酸氧化酶法)

(微板法 96 样)

产品简介:

肌酐 (Creatinine, CRE) 是肌肉代谢的产物, 主要通过肾小球滤过排出体外。在正常情况下, 体内肌酐的含量基本稳定。血液中的肌酐浓度可作为检测肾小球滤过功能的指标之一。本试剂盒利用肌酐酶特异作用于肌酐生成肌酸, 肌酸在肌酸酶和肌氨酸氧化酶的相继作用下生成过氧化氢, 过氧化氢与显色剂反应呈现紫色, 该有色物质在 546nm 有最大吸收峰, 进而计算得到肌酐含量。

试剂盒组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	液体 18mL×1 瓶	4°C保存	
试剂二	液体 6mL×1 支	4°C保存	
标准品	粉体 2mg×1 支	4°C保存	用前甩几下使粉体落入底部, 再加 1mL 蒸馏水溶解即标准品浓度为 2mg/mL, 再用蒸馏水稀释 40 倍 (1:39 份水) 成 0.05mg/mL, 即 442 μ mol/L 的肌酐标准品待检液。

所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、离心机、蒸馏水。

肌 酐 含 量 检 测:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备:

① 组织样本:

取约 0.1g 组织样本，加 1mL 的提取液研磨，粗提液全部转移到 EP 管中，12000rpm，常温离心 10min，上清液待测。

② 液体样品：澄清的液体可直接检测；若浑浊则离心后取上清液检测。

2、上机检测:

① 酶标仪预热 30min，设置温度在 37°C，设定波长到 546nm。

② 做实验前选取 2 个样本，找出适合本次检测样本的稀释倍数 D。

③ 所有试剂解冻至室温，在 96 孔板中依次加入：

试剂名称	测定管	空白管 (仅做一次)	标准管 (仅做一次)
样本	6		
蒸馏水		6	
标准品			6
试剂一	180	180	180
混匀，37°C 孵育 5min，于 546nm 处读取吸光值 A1。			
试剂二	60	60	60
混匀，37°C 孵育 5min 后于 546nm 处读取吸光值 A2， $\Delta A=A2-A1$ 。			

【注】:1. 测定管的 A 大于 0.5, 须用蒸馏水对样本进行稀释, 稀释倍数 D 代入计算公式。

2. 若 ΔA 的值小于 0.005, 可增加样本加样体积 V1 (如由 6 μ L 增至 10 μ L 或更多, 则试剂二相应减少, 空白管和标准管变化同测定管), 或增加样本取样质量 W; 则改变后的 V1 和 W 需代入公式重新计算。

结果计算:

1、按照质量计算:

肌酐含量(nmol/g)=(C 标准 \times V2) \times (ΔA 测定- ΔA 空白) \div (ΔA 标准- ΔA 空白) \div (V1 \div V \times W) \times

D=442 \times (ΔA 测定- ΔA 空白) \div (ΔA 标准- ΔA 空白) \div W \times D

2、按照体积计算:

肌酐含量(μ mol/L)=(C 标准 \times V2) \times (ΔA 测定- ΔA 空白) \div (ΔA 标准- ΔA 空白) \div V1 \times D

=442 \times (ΔA 测定- ΔA 空白) \div (ΔA 标准- ΔA 空白) \times D

C 标准---肌酐标品, 0.05mg/mL=442 μ mol/L=442nmol/mL; Mr---肌酐分子量, 113;

V1---加入样本体积, 0.006mL; V2---加入标准品体积, 0.006mL;

V---提取液体积, 1mL;

W---质量, g; D---稀释倍数, 未稀释即为 1。