

β -1,3-1,4-葡聚糖酶活测定试剂盒

(微板法 96 样)

产品简介:

β -1,3-1,4-葡聚糖酶 (又称地衣多糖酶; EC 3.2.1.73) 是一类重要的水解酶, 可以水解谷物中的 β -1,3-1,4-葡聚糖, 其在食品、饲料和纺织等领域的具有重要应用价值。

β -1,3-1,4-葡聚糖酶水解底物葡聚糖产生还原性糖。利用 3,5-二硝基水杨酸测定还原糖的量, 在 540nm 读取吸光值, 进而得出 β -1,3-1,4-葡聚糖酶的活性大小。

试剂盒组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 120mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 30mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	粉剂 mg×1 支	4℃保存	临用前甩几下使粉剂落入底部, 再加 1.1mL 蒸馏水, 80℃水浴 10min 充分溶解, 冷却至室温待用。
试剂三	液体 30mL×1 瓶	4℃保存	
标准品	粉体 mg×1 支	4℃保存	若重新做标曲, 则用到该试剂

所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、台式离心机、水浴锅、移液器、研钵、冰和蒸馏水。

β -1,3-1,4-葡聚糖酶 (β -1,3-1,4-GA) 活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

① 组织样本:

取约 0.1g 组织 (水分充足的样本可取 0.5g) 到研钵内, 加入 1mL 提取液, 在冰上进行冰浴匀浆或者液氮研磨。12000rpm, 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

[注]: 也可以按照组织质量 (g) : 提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例提取。

② 细菌/细胞样本:

先收集细菌/真菌到离心管内, 离心后弃上清; 取 500 万细菌/真菌加入 1mL 提取液; 冰浴超声波破碎细菌/真菌 (冰浴, 功率 20%或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm, 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

[注]: 也可按照细菌或细胞数量 (10^4 个) : 提取液体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例进行提取。

③ 液体样本: 若是澄清液体, 直接检测, 若液体样本浑浊, 需 4℃×12000rpm, 离心 10min, 取上清液检测。

2、上机检测:

① 酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 540nm。

② 所有试剂解冻至室温 (25℃), 在 EP 管中依次加入:


试剂名称 (μ L)	测定管	对照管
样本	50	50
试剂一	140	150

试剂二	10	100
混匀，37℃孵育 30min		
试剂三	150	150
混匀，95℃水浴 5min，取出后用自来水或冰水冷却至室温，取 200μL 澄清液体于 96 孔板中，在 540nm 处读取吸光值 A， $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ (每个样本做一个对照管)。		

【注】:若 ΔA 在零附近徘徊，可在样本制备时加大取样质量 W (如增至 0.5g) ,或在上机检测时加大上样量 V1 (由 50μL 增加到 100μL，则试剂一相应减少，保持总体积不变)，或延长反应时间 T (如增至 60min) ,则改变后的 W、V1 和 T 需带入计算公式重新计算。

结果计算:

1、标准曲线方程: $y = 0.0123x - 0.035$; x 为标准品浓度 (μg) , y 为 ΔA 。



2、按蛋白浓度计算：

酶活定义：每毫克组织蛋白每分钟分解葡聚糖产生 1μg 还原性糖定义为一个酶活性单位。

$$\beta\text{-1,3-1,4-GA}(\mu\text{g}/\text{min}/\text{mg prot})=[(\Delta A+0.035)\div 0.0123]\div (V1\times \text{Cpr})\div T$$

$$=54.2\times (\Delta A+0.035)\div \text{Cpr}$$

3、按样本鲜重计算：

酶活定义：每克组织样本每分钟分解葡聚糖产生 1μg 还原性糖定义为一个酶活性单位。

$$\beta\text{-1,3-1,4-GA}(\mu\text{g}/\text{min}/\text{g 鲜重})=[(\Delta A+0.035)\div 0.0123]\div (W\times V1\div V)\div T$$

$$=54.2\times (\Delta A+0.035)\div W$$

4、按细菌/真菌数量计算：

酶活定义：每 1 万个细菌或真菌每分钟分解葡聚糖产生 1μg 还原性糖定义一个酶活性单位。

$$\beta\text{-1,3-1,4-GA}(\mu\text{g}/\text{min} /10^4 \text{ cell})=[(\Delta A+0.035)\div 0.0123]\div (500\times V1\div V)\div T=0.11\times (\Delta A+0.035)$$

5、按液体体积计算：

酶活定义：每毫升液体中每分钟分解葡聚糖产生 1μg 还原性糖定义一个酶活性单位。

$$\beta\text{-1,3-1,4-GA}(\mu\text{g}/\text{min}/\text{mL})=[(\Delta A+0.035)\div 0.0123]\div V1\div T=54.2\times (\Delta A+0.035)$$

V---提取液体积，1mL； V1---样本上样体积，50μL =0.05mL；

T---反应时间，30min； W---样本鲜重，g；

500---细菌/真菌总数，500 万；

Cpr---样本蛋白质浓度，mg/mL；建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

附：标准曲线制作过程：

1 制备标准品（1mg/mL）：从标准品管中称量取出 2mg 至一新 EP 管中，再加 2mL

蒸馏水混匀溶解即 1mg/mL 的葡萄糖（母液需在两天内用且-20℃保存）。

2 把母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品：0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. mg/mL。也可

根据实际样本来调整标准品浓度。

3 依据 50 μ L 标准品+150 μ L 试剂一+150 μ L 试剂三，混匀 95 $^{\circ}$ C水浴 5min，取出后用

自来水或冰水冷却至室温，取 200 μ L 澄清液体于 96 孔板中，在 540nm 处读取吸光值

A，根据结果即可制作标准曲线。